

Empfehlung: Täglich 1 überzogene Tablette unzerkaut schlucken.
Lagerung: Trocken, vor Licht geschützt, nicht über Raumtemperatur (25° C).
Bitte die Gebrauchsinformationen beachten.
Wichtige Hinweise: Renavit ist kein vollständiges Lebensmittel und daher nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet.
 Nur unter ärztlicher Kontrolle verwenden.

100 überzogene Tabletten
Renavit[®]
 Wasserlösliche Vitamine



Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (ergänzende bilanzierte Diät nach EG-Richtlinie 1999/21/EG) zur Behandlung von ernährungsbedingten / dialysebedingten Vitaminmangelzuständen und eines erhöhten Homocysteinspiegels.

RenaCare NephroMed GmbH
 Werrastr. 1a, 35625 Hüttenberg

Renavit 100 überzogene Tabletten (45.0 g)

PZN - 03731595



recyclebar

Zutaten (je 100 g überzogene Tabletten): 28,5 g Ascorbinsäure; 4,7 g Nicotinamid; 2,8 g Pyridoxinhydrochlorid; 2,4 g Calciumpanthothenat; 747 mg Thiaminnitrat; 396 mg Riboflavin; 233 mg Folsäure; 70 mg Biotin; 0,002 mg Cyanocobalamin; Saccharose; Talkum; **Laktose**; Pulvercellulose; Farbstoffe: Titanoxid; Siliciumdioxid; Gummi arabicum; Polyvinylpyrrolidon; Glucosesirup; Magnesiumstearat; Calciumcarbonat; Pflanzliches Fett (gehärtet); Aluminiumsilikat; Gelatine; Hydroxypropylmethylcellulose; Maisstärke; Mono- u. Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoff: Cochenille-rot A; mikrokristalline Cellulose; Speisefettsäure; Sonnenblumenöl; Carnauba-Wachs.

Nährwert	pro 100 g	pro überzogene Tablette
Energie	848 kJ (198 kcal)	3,82 kJ (0,89 kcal)
Eiweiß	< 0,5 g	< 2,25 mg
Kohlenhydrate (davon Zucker)	22,0 g (22,00 g)	99,00 mg (99,00 mg)
Fett (davon gesättigte Fettsäuren)	1,40 g (1,30 g)	6,30 mg (5,90 mg)
Salz	0,02 g	0,09 mg

labopde-E100-140903-02

100 überzogene Tabletten



Renavit[®]

1 überzogene Tablette enthält:

Vitamin B ₁	3,0 mg
Vitamin B ₂	1,7 mg
Vitamin B ₆	10,0 mg
Vitamin B ₁₂	6,0 µg
Vitamin C	120,0 mg
Biotin	300 µg
Folsäure	1,0 mg
Nicotinamid	20,0 mg
Pantothensäure	10,0 mg

Mindestens
 haltbar bis Ende:
 Lot-Nr.: